

ຜົນຂອງການໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ້ນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ສະມັດຕະພາບການ
ຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຟື້ນເມືອງ

Effect of *Stylosanthes guianensis* CIAT 184 in Concentrate Ration on Native Goat Production Performance and Feed Cost

ພອນມະນີ ທຳມະຈັກ¹ ອຳງຄຳ ບຸດດາລາ² ແລະ ທະນຸໄຊ ຟົງອຸດົມ³

Phonmany Thammachuck, Angkham Boudala and Thanouxay Phongoudome

Abstract

The experiment was conducted at km 13 Agricultural Integrated Research Center, Faculty of Agriculture and Forestry, Champasack University. During January 2016 to May 2016 on the title: Comparison of different fermented food (banana trunk, Mor ning glory, Cabbage and Mixed) On Growth performance of *Eisenia foetida*. The purpose of this study to find fermented food for Growth of *Eisenia foetida*. By using Randomized Complete Block Design (RCBD) type contains 4 treatments of each 3 replications as details: T₁ = goat feed concentrations of 80%, 20% glossary; T₂ = goat feed concentrations of 60%, 40% glossary; T₃ = goat feed concentrations of 40%, 60% glossary; T₄ = goat feed concentrations of 20%, 80% glossary. Napier grass using a basic food. That the efficiency of the food 4 beta is relatively low, the growth of native goats. The present experiment the growth is the best current test T₃ which is weighing more than 3 kg, followed by the pilot T₄ which is weighing more than 3 kg, and yield less than the current trials 1 and 2, an average of 2 kg according to calculate the statistics that there are differences.

Keyword: *Stylosanthes guianensis* CIAT 184, native goat, napier (*Penisetum purpureum*)

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ຫຼັກ 13 ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ, ໃນລະຫວ່າງເດືອນ 12/2015 ຫາ ເດືອນ 5/2016 ໃນຫົວຂໍ້: ຜົນຂອງການໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ້ນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ສະມັດຕະພາບການ

¹ ພາກວິຊາ: ລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ

Department of Livestock, Faculty of Agriculture and Forestry Champasack University
Tel. 020 99978385, E-mail Address: Thammachakp@yahoo.com

² ພາກວິຊາ: ລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ

Department of Livestock, Faculty of Agriculture and Forestry Champasack University

³ ພາກວິຊາ: ລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ

Department of Livestock, Faculty of Agriculture and Forestry Champasack University

ຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຟື້ນເມືອງ. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດອັດຕາການນຳໃຊ້ ຖົ່ວ Stylo CIAT184 ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຟື້ນເມືອງ ການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບການທົດລອງແບບ RCBD (Randomized Complete Block Design) ປະກອບມີ 4 ຈຸດທົດລອງ ແລະ 3 ຊໍ້າຄື: T_1 = ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 80%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 20%; T_2 = ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 60%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 40%; T_3 = ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 40%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 60%; T_4 = ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 20%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 80%. ໂດຍນຳໃຊ້ຫຍ້າເປັນອາຫານ ຟື້ນຖານ.

ເຫັນໄດ້ວ່າປະສິດທິພາບຂອງອາຫານທັງ 4 ຈຸດທົດລອງ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ ຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ຟື້ນ ຟື້ນເມືອງ. ເຊິ່ງຈຸດທົດລອງທີ່ໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕດີທີ່ສຸດແມ່ນ ຈຸດທົດລອງ T_3 ເຊິ່ງໃຫ້ນ້ຳໜັກເຜີ້ມ ເທົ່າກັບ 3 kg, ຮອງລົງມາແມ່ນ ຈຸດທົດລອງ T_4 ເຊິ່ງໃຫ້ນ້ຳໜັກເຜີ້ມ ເທົ່າກັບ 3 kg, ແລະ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຈຸດທົດລອງທີ 1 ແລະ ທີ 2, ສະເລ່ຍແມ່ນ 2 kg ອີງຕາມການຄິດໄລ່ທາງດ້ານສະຖິຕິແລ້ວເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ.

ຄຳສຳຄັນ: ຖົ່ວສະໄຕໂລ, ຫຍ້າເປັນເປຍ, ແບ້ຟື້ນເມືອງ.

ພາກສະເໜີ

ບັນຫາດ້ານອາຫານສັດທີ່ກະທົບຕໍ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງແບ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຄືຜື້ນທີ່ທົ່ງຫຍ້າຖືກຈຳກັດລົງດ້ວຍ ເຫດຜົນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການປູກພືດເສດຖະກິດຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນ ຫຼາຍກ່ວາການລ້ຽງແບ້, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການລ້ຽງແບ້ຂອງຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ມັກມີບັນຫາຄືເຂົ້າໄປທຳລາຍ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ. ສະນັ້ນການລ້ຽງແບ້ໃນຮູບແບບປະປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນຕາມທຳມະຊາດແມ່ນນັບມື້ທີ່ຈະລຸດລົງ, ຈົນສິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້ອຍ, ຂາດແຮງງານປ່ຽນອາຊີບແລະປ່ຽນຜື້ນທີ່ໄປເຮັດກິດຈະກຳອື່ນທີ່ບໍ່ ແມ່ນການລ້ຽງແບ້, ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນແບ້ລຸດລົງສິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາຊີ້ນແບ້ແພງ ແລະ ຫາໄດ້ຍາກ, ຈາກການລາຍງານ ສະຖິຕິສັດລ້ຽງຂອງຂະແໜງລ້ຽງສັດ - ການປະມົງແຂວງຈຳປາສັກ (2012) ທົ່ວແຂວງມີຈຳນວນແບ້ທັງໝົດ 4,675 ໂຕ, ໃນນັ້ນມີຝາມລ້ຽງແບ້ທີ່ຈິດທະບຽນ 12 ຝາມ, ມີແບ້ທັງໝົດ 3,592 ໂຕ, ລາຄາຊີ້ນແບ້ຕາມທ້ອງຖະ ຫຼາດ 30,000-45,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ. ແບ້ເປັນສັດຄ່ຽວເອື້ອງຂະໜາດນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ມີສີນ້ຳຕານນອກຈາກນີ້ຍັງມີສີນ້ຳຕານປົນດຳ ຫຼື ມີທັງສີດຳ, ນ້ຳຕານ ແລະ ສີ ຂາວປົນກັນ, ມີເຂົ້າທັງໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່, ໃບຫຸ່ນ້ອຍຕັ້ງ, ນ້ຳໜັກເກີດໃໝ່ປະມານ 1.5 kg, ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຈະມີຄວາມສູງປະມານ 50 cm, ມີນ້ຳໜັກປະມານ 20-25 kg, ຜະລິດໄດ້ທັງຊີ້ນ ແລະ ນ້ຳນົມທີ່ຕ່ຳ.

ຖົ່ວສະໄຕໂລ (Stylo CIAT 184) ເປັນພືດອາຫານສັດທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີໃນຜື້ນທີ່ເຂດຮ້ອນ, ສາມາດປັບໂຕໄດ້ດີໃນຜື້ນທີ່ດິນຊາຍແລະ ສະພາບດິນເປັນອາຊິດ (ຈຸລິຣັດ ແລະ ຄະນະ, 2005), ມີຊີງຟຸ່ມຕັ້ງ ແລະ ຊີງຟຸ່ມໃຫຍ່ກ່ວາຖົ່ວຮາມາຕາ, ມີຄວາມໜ້າກິນສູງໃນຊ່ວງທີ່ໃກ້ອອກ ດອກ (ກອບແກ້ວ, 2001), ຜົນຜະລິດນ້ຳໜັກແຫ້ງ 1,5-2,5 ໂຕນ/ໄລ່/ປີ, ໃນດ້ານຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານເມື່ອອາຍຸຕັດ 60 ວັນ, ມີວັດຖຸແຫ້ງ 26,89% ໂປຣຕິນ ລວມ 15,58%, ADF 36,28% ແລະ NDF 51,58% (ສຸກໄຊ, 2005), ຊຶ່ງໃນການເພີ່ມການຈະເລີນເຕີບໂຕແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານພືດອາຫານສັດ, ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດສັດຕໍ່ໂຕ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນສັດຕໍ່ຜື້ນທີ່ປູກພືດອາຫານສັດວິທີປະຕິບັດອີກວິທີໜຶ່ງຄື

ການໃສ່ຜຸນ. ອີງຕາມຄຸນລັກສະນະພິເສດທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ອົງປະກອບທາງດ້ານເຄມີຖ້ານຳເອົາຖົ່ວຊະນິດນີ້ມາປະສົມທົດແທນອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດລູກການໃຊ້ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນລົງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນການສຶກສາເຖິງຜົນຂອງການນຳໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນໃນອັດຕາສ່ວນຕ່າງ ໆຕໍ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຟື້ນເມືອງເພື່ອພັດທະນາການລ້ຽງ, ເພີ່ມ ປະລິມານຊີ້ນ, ລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ສິນໃຈລ້ຽງແບ້.

ຈຸດປະສົງ

1. ເພື່ອກຳນົດອັດຕາການນຳໃຊ້ຖົ່ວ Stylo CIAT 184 ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຟື້ນເມືອງ.

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ


ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ

ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ທີ່ສູນກະສິກຳແບບປະສົມປະສານຫຼັກ 13 ຂອງຄະນະກະເສດ ສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ, ເຊິ່ງເປັນສູນທີ່ໃຊ້ທົດລອງ ແລະ ສາທິດພາກປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກ ສາພ້ອມທັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຖານທີ່ແມ່ນຫ່າງຈາກໂຕເມືອງປາກເຊປະມານ 13 km, (ໄປທາງປາກເຊ-ເວີນຄາມ), ໂດຍໃຊ້ໄລຍະເວລາທົດລອງລ້ຽງທັງໝົດ 7 ເດືອນ, ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂລຕະຫຼອດເຖິງການນຳມາປະສົມອາຫານເປັນເວລາ 3 ເດືອນ, ແຕ່ເດືອນ 12/2015 - 03/2016 ນຳແບ້ເຂົ້າມາລ້ຽງຕະຫຼອດສິ້ນສຸດການທົດລອງ, ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ, ແຕ່ເດືອນ 03/2016 - 05/2016.

ວິທີການທົດລອງ

ໃຊ້ແບ້ຟື້ນເມືອງເພດຜູ້, ທີ່ມີອາຍຸຫຼັງຢ່າງນົມ, ບໍ່ຕອນ, ອາຍຸປະມານ 4 ເດືອນ, ນ້ຳໜັກສະເລ່ຍ 7-10 ກິໂລກຼາມ/ໂຕ, ຈຳນວນ 12 ໂຕ, ວາງແຜນການທົດລອງແບບສຸມສົມບູນພາຍໃນປູ່ອກ RCBD (Randomized Complete Block Design), ມີ 4 ສິ່ງທົດລອງ (Treatment), 3 ຊ້ຳ (Replication), ໃຫ້ແບ້ທົດລອງໃນແຕ່ລະ ສິ່ງທົດລອງໄດ້ຮັບຖົ່ວສະໄຕໂລ 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ ໃນອັດຕາສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- C₈₀S₂₀ ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 80%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 20%
- C₆₀S₄₀ ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 60%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 40%
- C₄₀S₆₀ ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 40%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 60%
- C₂₀S₈₀ ໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ 20%, ຖົ່ວສະໄຕໂລ 80%
- (ໝາຍເຫດ: C – Concentrate ແລະ S – Stylo



ຮູບທີ 1 : ການວາງແຜນການທົດລອງ

ຄອກ ແລະ ອາຫານທົດລອງ

ລ້ຽງແບ່ງໃນໂຮງເຮືອນຂະໜາດ 3 x 8 m, ຍົກຜືນສູງປະມານ 1 m, ພາຍໃນໂຮງເຮືອນແບ່ງເປັນ ຄອກຄັງດຽວຂະໜາດ 1 x 1m, ຈຳນວນ 12 ຄອກດຽວ, ຄອກມຸງດ້ວຍຫຍ້າ, ແອ້ມດ້ວຍໄມ້ດົ້ວ, ອ້ອມຂ້າງອີກຊັ້ນໜຶ່ງ ດ້ວຍຜ່າກັນແສງ, ເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດງ ແລະ ຝົນຕົກສາດໃສ່, ພາຍໃນຄອກຈະມີອຸປະກອນໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ໃຫ້ອາຫານ ຄົບຊຸດ, ຫຼັງຈາກສ້າງຄອກສຳເລັດແລ້ວແມ່ນອານາໄມຄອກ ແລະ ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍປຸນຂາວ.

ອາຫານປະສົມທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງແມ່ນປະສົມຕາມສູດທີ່ກຳນົດປະກອບດ້ວຍ: ມັນ ຕົ້ນບົດ, ຮຳ, ກາກຖົ່ວເຫຼືອງ, ປາປິນ, ເປືອກຫອຍປິ່ນ, ເກືອ, ໄດແຄຣຊຽມຟອສເຟດ ແລະ ພຣີມິກ, ໂດຍມີໂປຣຕິນລວມ (%CP) 12.95% ແລະ ມີສານອາຫານທີ່ຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ (TDN) 71.87% (ສຸດອາຫານດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້). ການ ປະສົມອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນຈະປະສົມໃຫ້ໄດ້ປະລິມານໃນຈຳນວນພຽງພໍສຳລັບລ້ຽງແບ່ງພາຍໃນ 15 ວັນເພື່ອໃຫ້ແບ່ງໄດ້ຮັບຄຸນ ນະພາບດີ ແລະ ໃໝ່ສົດຢູ່ສະເໝີ.

ຕາຕະລາງ 1: ສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານ

ສ່ວນປະສົມ	ອັດຕາສ່ວນ
ຮຳອ່ອນ	35
ມັນຕົ້ນບົດ	40
ກາກຖົ່ວເຫຼືອງ (44%)	15
ກາກນ້ຳຕານ	8
ແຮ່ທາດ	1
ເກືອ	1
ລວມ	100
ໂປຣຕິນ (%)	12-13%

ດຳເນີນການປູກຖົ່ວ ແລະ ມີການຕັດຄັ້ງທຳອິດຫຼັງປູກທຳອິດເມື່ອອາຍຸ 90 ວັນ ແລະ ຕັດຄັ້ງຕໍ່ໄປເມື່ອຫຍ້າ ອາຍຸ 60 ວັນ, ຈາກນັ້ນນຳມາຕັດໃຫ້ມີຄວາມຍາວ 1-2 cm, ນຳມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງເຫຼືອຄວາມຊຸ່ມປະມານ 12-15% ນຳໄປບີດໃຫ້ມຸ່ນ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳໄປປະສົມອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ມທີ່ກຽມໄວ້.

ຈາກນັ້ນນຳເອົາອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ມທີ່ກຽມໄວ້ມາປະສົມກັບຖົ່ວສະໄຕໂລບິດຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ກຳນົດໃນແຕ່ ລະສິ່ງ ທົດລອງ, ໂດຍປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີກ່ອນນຳໄປໃຫ້ແບ່ກິນ. ແບ່ງອາຫານໃຫ້ກິນວັນລະ 3 ຄັ້ງຄື: ຕອນເຊົ້າເວ ລາ 7:30; ຕອນສວຍ 12:30 ແລະ ຕອນແລງ 17:30 ໂມງ. ການໃຫ້ອາຫານແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ໃນປະລິມານ 0.5 - 1 kg/ໂຕ/ຄັ້ງ ແລະ ໃຫ້ຫຍ້າເປຍ Napier (*Peninsetum purpureum*) ເສີມໃນອັດຕາເທົ່າກັນ 1 - 2 kg/ໂຕ/ວັນ.

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ບັນທຶກນ້ຳໜັກແບ່ໂດຍການຊັງທຸກໆ 14 ວັນ ແລະ ນ້ຳໜັກສຸດທ້າຍ, ບັນທຶກປະລິມານອາຫານທີ່ແບ່ກິນໄດ້ ໃນ ແຕ່ລະວັນ, ຊັງນ້ຳໜັກອາຫານທີ່ໃຫ້ ແລະ ອາຫານທີ່ເຫຼືອ, ຄິດໄລ່ອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານເປັນນ້ຳໜັກໂຕ ແລະ ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານ.

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ສົມທຽບແບບລະບົບLSD(Least Significant Difference). ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ດ້ວຍ ໂປຼແກຼມ Statistix 8.0 ເຮັດກາ ວິເຄາະຫາ ຄວາມແປປວ ແບບ Analysis of Variation (ANOVA) (ພັດຮະຊິນີ, 2007).

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານ

ຜົນຈາກການທົດລອງຜົນຂອງການໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ມໃນອັດຕາທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນຕໍ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ່ພື້ນເມືອງ ເຫັນວ່າ ແຕ່ລະຈຸທົດລອງມີລັກສະນະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ຂ້ອນຂ້າງດີຄື: ຈຸທົດລອງທີ່ເສີມຖົ່ວ 20% ໃນສູດອາຫານ ສາມາດສ້າງນ້ຳໜັກເຝີມໄດ້ 2 kg/ ໂຕ, ຈຸທົດລອງທີ່ເສີມຖົ່ວ 40% ໃນສູດອາຫານ ສາມາດສ້າງນ້ຳໜັກເຝີມໄດ້ 2 kg/ໂຕ, ຈຸທົດລອງທີ່ເສີມຖົ່ວ 60% ໃນສູດອາຫານ ສາມາດສ້າງນ້ຳໜັກເຝີມໄດ້ 3.66 kg/ໂຕ ແລະ ຈຸທົດລອງທີ່ເສີມຖົ່ວ 80% ໃນສູດອາຫານ ສາມາດ ສ້າງນ້ຳໜັກເຝີມໄດ້ 2 kg/ໂຕ, ແລະ ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງຕໍ່ ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງທີ 2 : ຜົນຂອງການເຝີມຂຶ້ນທາງດ້ານນ້ຳໜັກຂອງແບ່

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳ	T1	T2	T3	T4	%CV	SEM	F-test
ຈຳນວນແບ່ທົດລອງ (ໂຕ)	3	3	3	3	-	-	-
ຈຳນວນວັນທີ່ລ້ຽງ (ວັນ)	84	84	84	84	-	-	-
ນ້ຳໜັກຂອງແບ່ (kg/ໂຕ)					-	-	-

- ນ້ຳໜັກເລີ່ມຕົ້ນ	8	8.3	8.6	7.66	-	-	-
- ນ້ຳໜັກສຸດທ້າຍ	10	10.3	12.3	9.66	32.69	± 1.99	0.36 ^{NS}
- ນ້ຳໜັກເພີ່ມ	2	2	3.66	2	100.65	± 1.40	0.35 ^{NS}
ປະລິມານອາຫານທີ່ໃຊ້ຊ້ຽນ (kg/ໂຕ)	37.6	37	42.6	36.2	27.67	± 6.13	0.23 ^{NS}
ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ g/ໂຕ/ວັນ	24	24	43	24	100.05	± 16.5	0.35 ^{NS}
ອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານເປັນຊີ້ນ	21.0	21.6	16.6	21.0	51.6	± 5.28	0.6 ^{NS}

ໝາຍເຫດ: NS= not significantly (ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ)

ຜົນຈາກການທົດລອງຜົນຂອງການໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຜືນເມືອງ ໂດຍການນຳໃຊ້ຫຍ້າເປັນອາຫານຜືນຖານ. ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງໃນຕາຕະລາງ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຜົນການນຳໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລແຫ່ງບົດຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ ໃນການລ້ຽງແບ້ຜືນເມືອງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຫັນໄດ້ຈາກການລ້ຽງໃນໄລຍະ 3 ເດືອນເຫັນວ່າມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ ແລະ ອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານເປັນຊີ້ນກໍ່ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ. ເຊິ່ງເມື່ອທຽບກັບການທົດລອງຂອງພິສຸດ ແລະ ຄະນະ(2004) ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລສີດປະສົມກັບຫຍ້າຊີກນານ(*Brachiaria humi dicola*) ທີ່ມີໂປຣຕິນໜ້ອຍກວ່າ 7% ປະສົມກັນໃນອັດຕາສ່ວນ 1:1 ຕໍ່ນ້ຳໜັກໂຕເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລະດັບໂປຣຕິນເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 10%, ເມື່ອນຳໄປລ້ຽງແບ້ຜືນເມືອງເພດຜູ້ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕສູງກວ່າການລ້ຽງແບ້ໂດຍໃຊ້ຫຍ້າຊີກນານຢ່າງດຽວ. ສອດຄ່ອງກັບ ສັກດາ ແລະ ຄະນະ (2004) ໂດຍການທົດລອງໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ(*Stylo*) ແຫ່ງຮ່ວມກັບຫຍ້າຊີກນານລ້ຽງງົວຜັນອາເມລິກັນບຣາມັນເພດຜູ້, ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບອາຫານຫຍາບ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງງົວດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີອັດຕາສ່ວນຂອງຖົ່ວສະໄຕໂລບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 50%, ຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານຫຍາບມີໂປຣຕິນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເປັນ 10.23%.

ຍ້ຽມ ແລະ ຄະນະ (2008) ໄດ້ເຮັດການທົດລອງ, ໂດຍນຳໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລປະສົມກັບຫຍ້າຊີກນານແຫ່ງໃນອັດຕາ 1:1 ຫຼື 50%, ໂດຍໃຫ້ກິນຢ່າງເຕັມທີ່, ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ເສີມດ້ວຍອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນທີ່ມີໂປຣຕິນ 15%, ໃຫ້ ກິນໃນອັດຕາ 2%/ນ້ຳໜັກໂຕ, ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີຂຶ້ນສະເລ່ຍ 93.88 g/ໂຕ/ວັນ, ມີປະສິດທິພາບ ການແລກປ່ຽນອາຫານສະເລ່ຍ 6.78

ເສກສັນ ແລະ ຄະນະ (2011) ໄດ້ເຮັດການທົດລອງນຳໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ *Stylosanthes guianensis* CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນໃນອັດຕາສ່ວນແຕກຕ່າງກັນຄື: 1) ໃຫ້ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ ແລະ ຖົ່ວສະໄຕໂລໃນອັດຕາ 80:20, 2) ໃຫ້ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ ແລະ ຖົ່ວສະໄຕໂລໃນອັດຕາ 60:40, 3) ໃຫ້ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ ແລະ ຖົ່ວສະໄຕໂລໃນອັດຕາ 40:60, 4) ໃຫ້ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ ແລະ ຖົ່ວສະໄຕໂລໃນອັດຕາ 20:80. ໃຊ້ໄລຍະເວລາລ້ຽງ 120 ວັນ, ໂດຍ ນຳເອົາຖົ່ວສະໄຕໂລແຫ່ງບົດປະສົມໃນອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນໃຫ້ກິນຕາມນ້ຳໜັກໂຕ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ມີການເສີມອາຫານຫຍາບ (ຫຍ້າ), ທົດລອງກັບແບ້ຜືນເມືອງ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບປະກົດວ່າ: ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ($P < 0.05$) ໂດຍການໃຫ້ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນ : ຖົ່ວສະໄຕໂລໃນອັດຕາ 80:20 ສູງກວ່າໝູ່ສະເລ່ຍ 101.34 g/ໂຕ/ວັນ, ນ້ຳໜັກເພີ່ມ 12.34 kg/ໂຕ.

ໃນການທົດລອງ ຜົນຂອງການໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຜືນເມືອງ. ເຊິ່ງເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 22/02/2016-22/05/2016 ເຊິ່ງໃຊ້ໄລຍະເວລາທັງໝົດ 3 ເດືອນ ເຊິ່ງໃຊ້ອາຫານທັງໝົດຈຳນວນ 460.56 ກິໂລ

ເຊິ່ງໃຊ້ ຈຸທິດລອງ T1= 112.98 kg ຫລື 37.66 kg/ໂຕ, T2= 111 kg ຫລື 37 kg/ໂຕ, T3= 127.98 kg ຫລື 42.66 kg/ໂຕ ແລະ T4= 108.6 kg ຫລື 36.2 kg/ໂຕ ເຊິ່ງຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 3.600 ກີບ/kg ແລະ ຖົ່ວສະໄຕໂລແຫ້ງແມ່ນໄລ່ສະເລ່ຍແມ່ນ ກິໂລລະ 10,000 ກີບ ເຊິ່ງສະແດງຕົ້ນທຶນຄ່າ ຈາກຜົນໄດ້ຮັບ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນ້ຳໜັກ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບລາຄາອາຫານທີ່ນຳໃຊ້ ເພາະວ່າລາຄາຂ້ອນຂ້າງ ສູງ ແຕ່ໃຫ້ຜົນການຜະລິດຕ່ຳ.

ຕາຕະລາງທີ 3: ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ

ຈຸທິດ ລອງ	ອາຫານທີ່ໃຊ້ ທັງໝົດ (kg)	ອາຫານເຂັ້ມ ຂຸ້ນ (kg)	ຖົ່ວສະໄຕ ໂລ (kg)	ລາ ອາຫານ (ກີບ/kg)	ລາຄາຖົ່ວ (ກີບ/kg)	ຄ່າອາຫານ ເຂັ້ມຂຸ້ນ	ຄ່າຖົ່ວສະ ໄຕໂລ	ລວມມູນຄ່າ (ກີບ)
T1	112.98	90.384	22.596	3,600	10,000	325,382	225,960	551,342
T2	111	66.6	44.4	3,600	10,000	239,760	444,000	683,760
T3	127.98	51.192	76.788	3,600	10,000	184,291	767,880	952,171
T4	108.6	21.72	86.88	3,600	10,000	78,192	868,800	946,992
ລວມທັງໝົດ						827,625	2,306,640	3,134,265

ສະຫຼຸບ

ຜ່ານການທົດລອງ: ຜົນຂອງການໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນຕໍ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດແລະຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຜື້ນເມືອງ ເຫັນວ່າ: ການນຳໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລໃນສູດ ອາຫານທັງ 4 ຈຸທິດລອງ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ຜື້ນເມືອງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ.

ຂໍ້ແນະນຳ

ໃນການຜົນຂອງການໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ CIAT 184 ຮ່ວມກັບອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານຂອງແບ້ຜື້ນເມືອງ. ໂດຍມີຈຸດ ປະສົງເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານໃນການລ້ຽງ ເພື່ອຢາກເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງມີຄວາມຊັດເຈນແນ່ນອນຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນການທົດລອງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງຂໍແນະນຳບາງບັນຫາດັ່ງນີ້: ໃນການລ້ຽງສັດກະຜາລວມ ຄວນຮັບປະກັນທາງດ້ານທັງຫຍ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບອາຫານຕ່າງໆທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນນັ້ນ ຄວນເລືອກເອົາຊະນິດທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ, ມີໃນທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ປະຢັດຕົ້ນທຶນ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

- ເສກສັນ ສວນກູນ, ມິນທິຊາ ພຸດຊາຄຳ ແລະ ສິລິ ລັກ ວົງພິເສນ. (2011). ຜົນຂອງການໃຊ້ ຖິ່ນສະໄຕໂລຮ່ວມກັບ ອາຫານເຂັ້ມຊຸ້ນ ໃນອັດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ຕໍ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃນການລ້ຽງແບ້ພື້ນເມືອງ. ລາຍງານກອງ ປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນງານວິໄຈຂອງ ມສທ ວິໄຈ ປະຈຳ ປີ 2011.
- ຂະແໜງວິຊາການຈັດການ ການກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນມະຫາວິທະຍາໄລສຸໂຂໄທທຳມາທິລາດ. ໜ 257 (ພາສາ ໄທ)
- ສັກດາ ປະຈັນບຸນເຈດຖາ, ຈຸຣິລັດ ເງິນແດງ ແລະ ພິລິມ ບົວແກ້ວ. (2004). ຫຍ້າຊີກນານຊະນິດເລືອ ແລະ ຖິ່ນສະໄຕ ໂລເປັນອາຫານ ຫຍາບລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນ. ການປະຊຸມວິຊາການສັດຕະວະສາດຄັ້ງທີ 2 ເລື່ອງກ້າວທັນສະໄໝກັບ ປະສຸສັດໄທ. ພາກວິຊາສັດຕະວະສາດ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ. ໜ 155 (ພາສາໄທ)
- ຍ້ຽມ ຄົງສະຫວັດ, ສັກດາ ປະຈັນບຸນເຈດຖາແລະ ຈັກກະພົງ ຂານໂບ. (2008). ຜົນຂອງການເສີມອາຫານເຂັ້ມຊຸ້ນຕໍ່ ກັບສະມັດຖະພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ລູກປະສົມແອງໂກນູບຽມໃນສະພາບການລ້ຽງແບບຂັງຄອກ. ລາຍງານຜົນການວິໄຈກອງອາຫານສັດປະຈຳປີ 2008. ກົມປະສຸສັດ ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. ໜ 258 (ພາສາໄທ)
- ພິສຸດ ສຸກກະເສມ, ສະຖິດ ມັງມິໄຊ ແລະ ພິລິມບົວແກ້ວ. (2004). ການໃຊ້ຖິ່ນທຳຜະສະໄຕໂລລ້ຽງແບ້ພັນຊີ້ນ. ລາຍ ງານການວິໄຈກອງອາຫານສັດປະຈຳປີ 2004. ກົມປະສຸສັດ ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. 230 (ພາສາ ໄທ).

